

## TRAITEMENT PAR PROTHÈSE DE L'ARTHROSE DE LA HANCHE

Texte : D. Gosset  
Illustrations : J. Dasic

**Le**  
**Mess**  
Pôle Santé Colmar

Consultations :  
4D, avenue du Général de Gaulle  
F-68000 COLMAR

tel : +(33) 3 89 23 09 90

La **hanche** est constituée de la partie supérieure de l'os de la cuisse (**tête du fémur**) et de la cavité du bassin (**cotyle**) dans laquelle elle coulisse.

Au niveau de cette articulation, un revêtement souple (le **cartilage**) recouvre les zones d'os en contact et permet leur glissement.

Or, ce dernier est usé de manière importante (**arthrose**).

L'os se retrouve petit à petit à découvert et se déforme, ce qui entraîne des frottements lors des mouvements.

L'articulation devient de plus en plus raide et douloureuse.

La situation peut s'aggraver au point de vous empêcher de marcher, ou d'entraîner des problèmes au niveau d'autres articulations.

C'est pourquoi votre chirurgien vous propose une opération (**arthroplastie de la hanche**).

Il s'agit d'enlever une partie ou la totalité de l'articulation et de la remplacer par du matériel artificiel de même forme (**prothèse**).



Soit vous dormez complètement (**anesthésie générale**), soit on endort seulement le bas de votre corps (**anesthésie périmédullaire**).

Le chirurgien coupe la tête du fémur, puis creuse dans l'os pour y introduire la tige de la prothèse, qu'il fixe avec ou sans ciment.

L'opération s'arrête là si on ne remplace que la tête du fémur (**prothèse céphalique**).

S'il faut remplacer également le cotyle (**prothèse totale**), le chirurgien enlève le cartilage et prépare l'os de façon à y placer une sorte de bol creux (**cupule**) dans lequel vient coulisser la tête de la prothèse.

Cette opération dure généralement une à deux heures.



Pendant l'intervention, les os peuvent casser (**fracture**). Si des muscles, tendons, vaisseaux sanguins ou nerfs sont blessés accidentellement, cela nécessite des réparations complémentaires et entraîne dans le pire des cas des saignements importants (**hémorragie**) ou des répercussions sur le fonctionnement ou la sensibilité de la jambe. Rassurez-vous, ces risques sont rares.

Vous restez hospitalisé hospitalisé 2 à 5 jours, il est aussi possible de rentrer le jour même.

Si la douleur est importante au tout début, il existe des traitements pour vous soulager. Il est normal d'avoir mal les premières fois que vous vous levez et que vous recommencez à marcher. Mais les douleurs liées à l'arthrose ont disparu.

Si des microbes envahissent la prothèse (**infection**), il faut un traitement médical prolongé et parfois une nouvelle intervention. Pour limiter ce risque, on vérifie que vous n'avez aucune maladie avant, pendant et après l'opération.

Un traitement permet de limiter le risque de formation de bouchons de sang (**caillots**) dans les veines des jambes (**phlébite**).

Il arrive que les deux jambes ne soient plus de la même longueur après l'opération, ce qui fait boiter légèrement.

Plusieurs semaines de rééducation peuvent être nécessaires.

Il est préférable de mener une vie calme pendant deux à trois mois, en reprenant progressivement vos activités. La prothèse risque de se déboîter (**luxation**).

Avec le temps, le matériel tient moins bien dans l'os (**descellement**). A terme il faut le changer.

Le résultat de l'opération est souvent spectaculaire. Certains oublient qu'ils portent une prothèse ! Evitez cependant les sports violents et les travaux de force.

